




14.842  
11.6













# A KŐSZEI



## MÚZEUM-KÖZLEMÉNYEI

II. SOROZAT, 6. SZÁM.

SERIES II. NRUS. 6.

PUBLICATIONES MUSEI GINSIENSIS

CSIKI ERNŐ:

### ADATOK KŐSZEG ÉS VIDÉKE BOGÁRFAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ

### BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER KÄFERFAUNA VON KŐSZEG UND UMGEBUNG

(Különlenyomat a DUNÁNTÚLI SZEMLE VIII. évfolyamának 3., 5. és 6. számaiból.)

Kiadja

Kőszeg Város Helytörténeti és Szülőföldismereti Múzeuma.

1941.

R  
2

14892/II 6

ORSZ. SZÉCHENYI-KÖNYVTÁR  
Növekedéskönyvtár  
1942. év 2955 sz.

R  
1905



## Adatok Kőszeg és vidéke bogárfaunájának ismeretéhez.

CSIKI  
ERNŐ

Négy évvel ezelőtt jelent meg Kaszab Zoltán tanulmánya [4]<sup>1</sup> melyben összeállítja mindazon bogarak jegyzékét, amelyek erről a vidékről ismeretessé váltak.

Azóta magam is belekapcsolódtam a munkába, amennyiben elvállaltam a kőszegi múzeum részére gyűjtött anyag meghatározását. Ez az anyag legnagyobb részt Visnya Aladár dr. szorgalmas gyűjtéseinek eredménye. Most került feldolgozásra néhai Horváth Géza dr., ny. nemzeti múzeumi főigazgató 1933. évi kőszegi gyűjtése is. Azonkívül meghatároztam Kaszab Zoltán dr. 1937 június 22. és július 20. közötti gyűjtésének még feldolgozatlanul maradt részét is, mely azután részben a Magyar Nemzeti Múzeumba, részben a Kőszegi Városi Múzeumba került. Sok új adatot vettem fel végül néhai Freh Alfonz bencés tanárnak a kőszegi bencés gimnáziumban lévő és 1893-ban lezárt kéziratot leltárából is, melyet Kaszab Zoltán dr. volt szíves átnézni és belőle kijegyezni azokat a fajokat, amelyek Freh 1878-ban megjelent jegyzékében még nem szerepeltek, tehát valószínűleg későbbi évek gyűjtéséből származtak. Freh adatai között van néhány faj, amelyek megerősítésére azonban ezeknek újabb megeléje szükségesnek mutatkozik; ezeket a fajokat megfelelő jegyzetekkel kísérttem. Néhány faj saját gyűjteményemből került ebbe a jegyzékbe, ezeket főleg Szelényi Gusztáv dr. úrnak köszönhetem.

A meghatározások folyamán azután számos olyan fajt és

<sup>1</sup> A szögletes zárójelben lévő számok az alábbi „Irodalom” című rovat ugyanolyan számú adataira utalnak.



fajváltozatot állapíthattam meg, amelyek Kőszeg és vidékéről ezideig még ismeretlenek voltak. Számuk nem jelentéktelen, mert Kőszeg bogárfaunája így összesen 730 fajjal, illetőleg fajváltozattal gyarapodik az alábbi felsorolás alapján, úgy hogy leszámítva a törlendőket, Kőszeg és vidéke bogárfaunájából ezidőszerint 2111 fajt és fajváltozatot ismerünk.

A gyűjtők nevét rövidítve adom és pedig a következőképen: F = Freh Alfonz, H = Horváth Géza dr., K = Kaszab Zoltán dr. és V = Visnya Aladár dr.; a ritkábban szereplő gyűjtők nevét teljesen kiírtam. Ugyancsak meg-rövidítettem a leggyakrabban szereplő két termőhely megjelölését: Kg = Kőszeg és Kgh = Kőszegi hegység.

\*

### Irodalom. — Literatura.

1. Csiki, E.: Magyarországi új bogarak (Coleoptera nova ex Hungaria). II. (Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung. III, 1905, p. 575—582).
2. Csiki, E.: Magyarország Buprestidái, I—VI. (Rovartani Lapok XVI, 1909, p. 161—187; XVII, 1910, p. 17—22; XVIII, 1911, p. 162—171; XIX, 1912, p. 135—137; XX, 1913, p. 156—159; XXII, 1915, p. 88—107).
3. Csiki, E.: Magyarországi új bogarak (Coleoptera nova ex Hungaria). (Matem. és Természettud. Értesítő LIX, 1940, p. 916—920).
4. Kaszab, Z.: A kőszegi hegység bogárfaunájának alapvetése. — Grundlagen zur Kenntnis der Käferfauna des Kőszeger Gebirges (Vasi Szemle IV, 1937, p. 161—185; A Kőszegi Múzeum Közleményei. — Publicationes Musei Ginsiensis. I, nr. 2).
5. Kaszab, Dr. Z.: Die Buprestiden Ungarns, mit Beschreibung neuer Formen (Fragm. Faunist. Hung. III, 1940, p. 81—116).
6. Székessy, Dr. V.: Die Staphyliniden des historischen Ungarn. I—VII. (Fragm. Faunist. Hung. I, 1938, p. 37—42, 75—78; II, 1939, p. 1—4, 17—20, 33—36, 49—52; III, 1940, p. 49—59).

\*

### Additamenta ad enumerationem Coleopterorum regionis Ginsiensis.

#### Fam. I.: Carabidae. — Futóbogarak.

- Cicindela campestris* L. ab. *conjuncta* DT. — Kgh. (jún.—júl. K).  
*Carabus nitens* L. — Irottkö (F).  
*Nebria castanea* Boh. — Kg (F). Az Alpok havasi tájának lakója, így kőszegi előfordulásának megerősítésére újabb gyűjtése mutatkozik szükségesnek.  
*Elaphrus uliginosus* F. — Kg. (F).  
 — *cupreus* Duft. — Bozsok (tőpart, ápr. 27, Vég).  
*Clivina contracta* Fourcr. (*collaris* Hbst.). — Kg. (F), Kgh (júl., K).  
*Dyschirius aeneus* Dej. — Kg (F), Felső rétek (homokbánya júl. 7, 17, V).  
 — *globosus* Hbst. — Kg (Sphagnumos láp, szept. 10, V), Kgh (K).  
*Bembidion lampros* Hbst. var. *properans* Steph. — Felső rétek (homokbánya, júl. 17, V).  
 — *varium* Ol. — Kgh (jún.—júl., K).



- *Andreae* F. var. *Bualei* J. Duv. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V).
- *Genei* Küst. var. *Illigeri* Net. — Kgh (jún.—júl., K).
- *octomaculatum* Goeze. — Ugyanonnan.
- *inoptatum* Schm. — Ugyanonnan.
- *lunulatum* Fourcr. — Alsó erdő (szept. 22, V), Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V).
- Tachys bistriatus* Duft. — Kgh (jún.—júl., K).
- *quadristriatus* Duft. — Kg (F).
- Amara rufipes* Dej. — Kg (F).
- *tricuspidata* Dej. — Gubahegy (júl. 26, V), Kgh (jún.—júl., K).
- *plebeja* Gyll. — Kgh (jún.—júl., K).
- *similata* Gyll. — Kg (F).
- *lunicollis* Schdte. — Kőszeg (F).
- *familiaris* Duft. — Kőszeg (V).
- *ingenua* Duft. — Kg (F).
- *bifrons* Gyll. — Kg (Tiszti üdülő, aug. 10, V).
- *apricaria* Payk. — Ugyanonnan.
- *fulva* Deg. — Kg (F).
- Stomis pumicatus* Pz. — Bozsok (korhadó fában, okt. 29, Végh).
- Pterostichus cupreus* L. ab. *affinis* Sturm. — Kgh (jún.—júl., K).
- *vernalis* Panz. — Kg (F).
- *minor* Gyll. — Kg (utcán, jún. 29, V).
- *diligens* Strm. — Kgh (jún.—júl., K).
- *transversalis* Duft. — Ugyanonnan.
- Platyderus rufus* Duft. — Kg (V).
- Synuchus nivalis* Panz. — Kg (F).
- Agonum atratum* Duft. — Kg (V).
- *micans* Nic. — Felső rétek (júl. 19, V).
- Perigona nigriceps* Dej. — Kg (jún., coll. Csiki).
- Licinus depressus* Payk. — Kg (F).
- Amblystomus niger* Heer. — Alsó erdő (szept. 22, V).
- Chlaenius vestitus* Payk. — Kg (F).
- Oodes helopioides* F. — Kg (F).
- Anisodactylus signatus* Panz. — Kg (F).
- Ophonus punctatulus* Duft. — Kgh (jún.—júl., K).
- *puncticollis* Payk. — Gubahegy (aug. 18, V).
- *azureus* F. — Alsó erdő (rostálva, nov. 20, V), Ólmodi út (máj. 7, V), Kgh (jún.—júl., K), Bozsok (máj. 13, Végh).
- *cribricollis* Dej. — Kgh (jún.—júl., K).
- Harpalus pygmaeus* Dej. — Kg (V).
- *atratus* Latr. ab. *subsinuatus* Duft. — Kgh (júl., K), Kg (F, V).
- *rufitarsis* Duft. — Kgh (jún.—júl., K).
- *neglectus* Serv. — Ugyanonnan.
- *albanicus* Reitt. — Ugyanonnan.
- Trichotichnus laevicollis* Duft. — Ugyanonnan.
- Bradycellus harpalinus* Serv. — Felső rétek (aug. 19, V).
- Acupalpus dorsalis* F. — Kőszeg (F).
- *luteatus* Duft. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V), Felső erdő (júl. 13, V).



- *longicornis* Schm. — Kgh (jún.—júl., K).  
*Lebia marginata* Fourcr. — Tőzegmohás láp (júl. 19, V), Kgh (júl., K).  
*Demetrias atricapillus* L. ab. *erythrocephalus* Buyss. — Kg (aug. 14, V). A magyar faunára is új.  
*Metabletus obscuroguttatus* Duft. — Kg (F).  
*Microlestes minutulus* Goeze. — Kg (városházi fászpincében, okt. 1, V), Alsó rétek (szept. 29, V).  
 — *corticalis* Duft. var. *escorialensis* Bris. — Kg (V).  
*Lionychus quadrillum* Duft. — Kg (F).  
*Brachynus explodens* Duft. ab. *glabratus* Dej. — Kgh (jún.—júl., K).

Fam. II.: *Halipidae*.

- Peltodytes impressus* Panz. — Nemezgyárnál (ápr. 3, V).  
*Haliplus Heydeni* Whncke. — Talár tócsája (márc. 23, V).

Fam. III.: *Dytiscidae*. — Csíkbagarak.

- Noterus crassicornis* Müll. — Kg (F, V), Gubahegyi tócsa (ápr. 2, V, jún. 25, K), Bozsok (ápr. 13, Végh).  
 — *clavicornis* Deg. — Kg (F), Talár (márc. 23, 25, V), Gubahegyi tócsa (ápr. 2, V, jún. 25, K), Velem (hőforrás, márc. 25, V).  
*Laccophilus hyalinus* Deg. — Nemezgyári duzzasztó (máj. 17, V).  
 — *minutus* L. — Kőszeg (V), Városi téglagyár tócsája (ápr. 8, V), Nemezgyárnál (ápr. 3, V), Gubahegyi tócsa (jún. 25, K), Velem (márc. 25, V).  
*Hyphydrus ovatus* L. (*ferrugineus* L.). — Gubahegyi tócsa (jún. 25, K), Velem (hőforrás, márc. 25, V), Bozsok (parktó, júl. 27, V).  
*Bidessus nasutus* Sharp. — Gubahegyi tócsa (jún. 25, K).  
 — *geminus* F. — Kg (F, V), Nemezgyárnál (márc. 15, máj. 17, V), Gubahegyi tócsa (ápr. 2, V, jún. 25, K).  
*Coelambus impressopunctatus* Schall. — Nemezgyárnál (ápr. 9, V).  
*Hygrotus inaequalis* F. — Kg (F).  
*Hydroporus tristis* Payk. — Kg (V), Gubahegyi tócsa (jún. 25, K), Bozsok (park-tó, szept. 25, V), Borsmonostor (ápr. 1, V).  
 — *palustris* L. — Kg (V), Gubahegyi tócsa (jún. 25, K).  
*Graptodytes bilineatus* Strm. — Alsó rétek (febr. 12, V).  
*Copelatus ruficollis* Schall. — Borsmonostor (ápr. 1, V).  
*Gaurodytes paludosus* F. — Kg (V).  
 — *uliginosus* L. — Kg (V).  
 — *chalconotus* Pz. — Kg (V).  
*Ilybius guttiger* Gyll. — Kg (V).  
*Rhantus pulverosus* Steph. (*punctatus* Fourcr.). — Tőzegmohás láp (ápr. 13, V), Alsó rétek (V).  
 — *bistriatus* Bergstr. (*adpersus* F.). — Kg (F), Bozsok (máj. 5, Végh).  
*Graphoderes cinereus* L. ab. *simulator* Westh. — Gubah. tócsa (K).  
 — *zonatus* Hoppe. — Kg (F).

Fam. IV.: *Gyrinidae*. — Keringőbagarak.

- Orectochilus villosulus* Müll. — Hétforrás (F).



Fam. V.: *Scydmaenidae*. — Hangyabogarak.

*Euconnus Motschulskyi* Strm. — Kgh (jún.—júl., K).

*Scydmaenus Hellwigi* Hbst. — Kg (F).

Fam. VI.: *Clambidae*. — Pöttönbogarak.

*Loricaster testaceus* Muls. — Kg (V).

Fam. VII.: *Silphidae*. — Dögbogarak.

*Leptinus testaceus* Müll. — Kgh (jún.—júl., K).

*Nargus brunneus* Strm. — Kg (aug., V).

*Choleva agilis* Ill. — Kg (F).

*Catops nigricans* Sp. — Kg (F).

— *coracinus* Kelln. — Kg (V).

— *chrysomeloides* Pz. — Kg (F).

— *alpinus* Gyll. — Kg (F).

*Sciodrepa Watsoni* Sp. — Kg (Tachert-árok, júl. 18, V), Cák (V).

*Liodes hybrida* Er. — Alsó erdő (szept. 22, V).

— *dubius* Kug. — Kg (F).

*Anisotoma humeralis* F. ab. *globosa* Hbst. — Kgh (jún.—júl., K).

*Amphycillus globiformis* Sahlbg. — Alsó erdő (szept. 22, V), Kgh (jún.—júl., K).

*Agathidium atrum* Payk. — Kg (F), Alsó erdő (árokavar, febr. 14, júl. 2, nov. 20, V).

— *laevigatum* Er. — Kg (F), Kgh (jún.—júl., K).

— *bohemicum* Reitt. — Kgh (jún.—júl., K).

— *badium* Er. — Kg (F).

Fam. VIII.: *Orthoperidae*.

*Arthrolips piceus* Com. — Kg (V).

*Sericoderus lateralis* Gyll. — Kg (Városházi fászpincében rostálva, okt. 1, szénaboglya aljából, márc. 27, V), Alsó erdő (nov. 20, V).

— *Visnyae* Csiki. — Velem (Hosszúvölgy, gombáról, júl. 22, V).

Ezt a tudományra nézve is új fajt a Magyar Tudományos Akadémia „Mathematikai és Természettudományi Értesítő”-jében (LIX. kötet, 1940, p. 918) a következőkép irtam le:

Capite, pronoto (antice maculam nigrescentem exceptam), prosterno pedibusque rufobrunneis, elytris, meso- et metasterno, sternitisque abdominis nigris. Corpore fortiter convexo, supra polito, nitido, elytris haud coriaceis, superficie pilis levigatis sericeisque aureoflavis dense vestito. Elytris ad apicem fortiter angustatis. Long. 1 mm.

Hungaria occidentalis: Velem (Comit. Vas).

*S. laterali* Gyll. affinis, sed differt colore, elytris ad apicem fortiore angustatis et corpore convexiore.

A fej, az előtor háta (elül az áttetsző fejtől sötét folt kivételével), a mellő és a lábak barnás-vörösek, a szárnyfedők, a mellközép, a mellvég és a has feketék. A test erősebben domború, felülete síma, fénylő, nem bőr-szerűen ráncolt, finom hátrafelé irányult aranysárga selymes szőrözettel fedett. A szárnyfedők hátrafelé erősebben keskenyedők. Hossza 1 mm.

A *S. lateralis* Gyll. közeli rokona, attól színeződése, hátrafelé erősebben keskenyedő szárnyfedői és domborúbb teste különbözteti meg.

Előfordul a vasmegeyi Velem határában, ahol *Visnya Aladár dr. ny.*



tanár és a kőszegi városi múzeum igazgatója, 1939. évi július hó 22-én gyűjtötte gombáról. Az új fajt felfedezője és Kőszeg állatvilága lelkes kutatójának tiszteletére neveztem el.

Fam. IX.: *Histeridae*. — Sutabogarak.

- Teretrius picipes* F. — Kg (V), Kgh (jún.—júl., K).  
*Onthophilus striatus* Forst. — Alsó erdő (mohából, okt. 10, V),  
 Velem (gombából, júl. 22, V).  
*Plegaderus caesus* Herbst. — Kg (F).  
*Abraeus globulus* Creutz. — Kg (F).  
*Saprinus amoenus* Er. — Kg (V).  
*Gnathoncus rotundatus* Kug. — Kg (F).  
*Dendrophilus punctatus* Hbst. — Kg (F).  
*Micromalus flavicornis* Hbst. — Kg (F).  
*Hister helluo* Truqui. — Kgh (jún.—júl., K).  
 — *bissexstriatus* F. — Kg (F).  
 — *stercorarius* Hoffm. — Kg (F; házfalon, szept. 21, V).  
 — *carbonarius* Ill. — Kg (F).  
 — *bimaculatus* L. — Kg (V).

Fam. X.: *Ptiliidae*. — Pehelyszárnyú bogarak.

- Ptenidium fuscicorne* Er. — Kg (nov. 12, V).  
 — *pusillum* Gyll. — Kg (aug. 18 és nov. 12, V).  
 — *nitidum* Heer. — Tachert-árok (aug. 1, V).  
*Acrotichis grandicollis* Mannh. — Ólmodi út árka (júl. 13, V).  
 — *intermedia* Gillm. — Kg (több helyen rostálva, jún.—okt., K, V).  
 — *sericans* Heer. — Kg (V).

Fam. XI.: *Staphylinidae*. — Holyvafélék.

- Micropeplus porcatus* F. — Kg (F), Alsó rétek (ápr. 29, V).  
*Megarthus affinis* Mill. — Kg (gombából, júl. 29, V).  
 — *hemipterus* Ill. — Velem (gombából, júl. 22, V).  
*Protinus ovalis* Steph. — Kg (gombából, mohából, aug.—okt. V).  
 — *macropterus* Gyll. — Alsó erdő (moha, okt. 10, V).  
*Anthobium anale* Er. — Alsó rétek (ápr. 29, V), Bozsok (jún. 6, V).  
 — *longipenne* Er. — Kg (Székessy [6]).  
 — *ophthalmicum* Payk. — Kg (Székessy [6]).  
 — *florale* Pz. — Kg (Székessy [6]).  
*Acrulia inflata* Gyll. — Kg (gombából, aug. 9, V).  
*Xylodromus depressus* Grav. — Kg (naplementekor repült, V).  
*Lathrimaeum melanocephalum* Ill. — Kg (gombából, nov. 1, V; Székessy [6]).  
*Lesteva pubescens* Mannh. — Kg (jún. 21, V), Gyöngyöspart (V).  
*Anthophagus abbreviatus* F. ab. *fascifer* Reitt. — Kg (Székessy [6]).  
*Trogophloeus corticinus* Schall. — Felső rétek (szept. 22, V; ártér, V).  
*Oxytelus insecatus* Grav. — Kg (V, Székessy [6]; lakásban, V).  
 — *piceus* L. — Kg (F, Székessy [6]; lámpafénynél, jún. 12, V).  
 — *nitidulus* Grav. — Kg (F, Székessy [6]), Rohonci út (júl. 6, V),  
 Ólmodi út árka (júl. 13, V).  
 — *tetracaratus* Block. — Kg (F, Székessy [6], V).



- Platystethus arenarius* Fourcr. — Kg (F, Székessy [6]; tehéntrágyából ápr. 30 és jún. 30, V), Ólmodi út árka (júl. 13, V).  
 — *cornutus* Grav. — Felső rétek (ártér, júl. 7, V).  
 — *alutaceus* Thoms. — Ugyanonnan.  
 — *capito* Heer. — Kg (Székessy [6], Felső rétek (ártér, júl. 7, V).  
 Özkút (júl. 1, V), Vadászforrás (júl. 13, V).  
 — *nodifrons* Sahlbg. — Kg (F, Székessy [6]).  
 — *nitens* Sahlbg. — Felső rétek (ártér, júl. 7, V).  
*Bledius fracticornis* Payk. — Kg (szobában, jún. 10 és 30, V).  
*Oxyporus maxillosus* F. — Kg (F, Székessy [6]), Bozsok (Végh).  
 — — *ab. angularis* Gebl. — Kg (F, Székessy [6]).  
*Stenus bipunctatus* Er. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V).  
 — *ater* Mannh. — Alsó rétek (ápr. 29, V), Bozsok (tópart, V).  
 — *providus* Er. — Özkút (aug. 7, V).  
 — *nanus* Steph. — Alsó erdő (árokavarból, júl. 2, V), Léka (Pálkútnál, aug. 5, V), Bozsok (Park-tó partján, szept. 25, V).  
 — *circularis* Grav. — Felső rétek (okt. 19, V).  
 — *humilis* Er. — Felső rétek (okt. 19, V).  
 — *phyllobates* Pen. — Kg (Székessy [6]).  
 — *brunnipes* Steph. — Alsó rétek (szept. 24, V).  
 — *tarsalis* Ljungh. — Kg (nádas tócsánál, aug. 22, V).  
 — *cicindeloides* Schall. — Tachert-árok (júl. 18, V), Alsó rétek (ápr. 29, V), Gubahegyi tócsa (aug. 18, V), Velem (hőforrás tócsája, aug. 25, V).  
 — *binotatus* Ljungh. — Svábfalu tócsája (júl. 12, V).  
*Astenus angustatus* Payk. — Bozsok (park, júl. 27, V), Kg (tőzeg-mohás láp, aug. 19, V).  
*Stilicus Erichsoni* Fauv. — Kg (F).  
*Scopaeus laevigatus* Gyll. — Felső rétek (homokbánya, júl. 17, V).  
*Leptacinus formicetorum* Märk. — Kg (F).  
*Xantholinus angustatus* Steph. — Kg (Városházi fászpincében rostálva, okt. 1, V), Alsó erdő (mohából, szept. 22 és okt. 10, V).  
 — *linearis* Ol. — Kg (F), Városi vadászház (nov. 15, V).  
*Othius laeviusculus* Steph. — Kg (házfalon, szept. 21 és okt. 7, V).  
*Neobisnius procerulus* Grav. — Kg (F).  
*Philonthus laminatus* Creutz. — Kg (F).  
 — *carbonarius* Gyll. — Kg (F).  
 — *sanguinolentus* Grav. — Kg (F).  
 — *immundus* Gyll. — Kg (rothadó gombából, okt. 10, V).  
 — *varius* Gyll. — Kg (F).  
 — *longicornis* Steph. — Kg (F).  
 — *varians* Payk. — Kg (F).  
 — *sordidus* Grav. — Kg (lámpafénynél, júl. 17 és gombából júl. 29, V).  
 — *corvinus* Er. — Kg (F).  
 — *ventralis* Grav. — Kg (F).  
 — *quisquiliarius* Gyll. — Kg (F).  
 — — *ab. inquinatus* Steph. — Kg (F).  
 — *tenuis* F. — Kg (F).  
 — *vernalis* Grav. — Kg (F).



- *nigritulus* Grav. — Alsó rétek (szept. 29, V), Felső rétek (aug. 19, V), Bozsok (szept. 25, V).
- Staphylinus aeneocephalus* Deg. — Velem (mohából, júl. 22, V).
- Ontholestes tessellatus* Fourcr. (*nebulosus* F.) — Kg (F).
- *murinus* L. — Kg (F, utcán, júl. 9, V), Bozsok (máj. 5, dögön, Végh).
- Heterothops quadripunctula* Gr. — Kg (F).
- Velleius dilatatus* F. — Kg (F).
- Quedius lateralis* Grav. — Kőszeg (gombából, szept. 13, V).
- *rufipes* Er. — Királyvölgy (szept. 21, V).
- Mycetoporus splendidus* Grav. — Pogányvölgy (nov. 26, V).
- Bolitobius striatus* Ol. — Kg (F).
- *exoletus* Er. — Kg (mohából, júl. 13, V).
- *thoracicus* F. ab. *biguttatus* Steph. — Kg (gombából, aug. 7), Alsó erdő (Ólmodi út, szept. 22, V).
- Conosomus litoreus* L. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V).
- *immaculatus* Steph. — Alsó erdő (szept. 22, V).
- *bipustulatus* Grav. — Kg (F).
- Tachyporus chrysomelinus* L. — Alsó erdő (árokavar, júl. 2, V), Bozsoki völgy (szept. 25, V).
- *obtusus* L. — Kg (F).
- Tachinus humeralis* Grav. — Kg (F).
- *subterraneus* L. — Kg (F).
- *laticollis* Grav. — Kg (gombából, júl. 29, V).
- Gyrophæna affinis* Sahlbg. — Kg (gombából, aug. 8 és 9, V).
- *fasciata* Marsh. — Kg (gombából, aug. 4, V).
- *laevipennis* Kr. — Kg (gombából, aug. 9, V).
- *boleti* L. — Kg (szobában, júl. 28, V).
- Agaricochara laevicollis* Kr. — Pogányvölgy (szept. 17, V); Óház (szept. 10, V).
- Bolitochara bella* Märk. — Kg (F, Pável J.), Szalónak (aug. 4, V), Bozsoki völgy (szept. 25, V).
- Cordalia obscura* Grav. — Kg (F).
- Notothecta flavipes* Grav. — Kg (F).
- *anceps* Er. — Kg (F).
- Atheta (Metaxya) elongatula* Grav. — Kg (F).
- *nigritula* Grav. — Kőszeg (F).
- *fungicola* Thoms. (*nitidicollis* Fairm.) — Kőszeg (F, Pável J.).
- (*Liogluta*) *granigera* Kiesw. — Kg (F).
- (*Dimetrota*) *subrugosa* Kiesw. — Kg (F).
- (*Acrotona*) *orphana* Er. — Kg (Pável J.).
- Zyras cognatus* Märk. — Kg (F).
- *limbatus* Payk. — Kg (F).
- Atemeles paradoxus* Grav. — Kg (F).
- Phloeopora angustiformis* Bdi. — Kg (szept. 10, V), Óház (V).
- Dinarda dentata* Grav. — Kg (F).
- Ocyusa prociua* Er. — Kg (Pável J.).
- Oxypoda vittata* Märk. — Kg (F, naplementekor repülve, okt. 12, rothadt gombából és mohából, okt. 10 és 13, V).
- *exoleta* Er. — Kg (F).



- *alternans* Grav. — Kg (F, rothadt gombából, okt. 10, V), Bozsoki völgy (szept. 25, V).
- *formosa* Kr. — Kg (F).
- *abdominalis* Mannh. — Kg (F).
- *formiceticola* Märk. — Kg (F).
- *annularis* Mannh. — Kg (F), Alsó erdő (szept. 22, V), Cák (Borhakút, júl. 29, V).

*Thiasophila angulata* Er. — Kg (F).

*Aleochara crassicornis* Boisd. — Felső rétek (ártér, júl. 7, V).

— *intricata* Mannh. (*bipunctata* Er. non Ol.) — Kg (F).

— *sparsa* Heer. — Oháznyereg és Hétforrás (gombából, okt. 17, V).

— *villosa* Mannh. — Kg (F).

— *bipustulata* L. (*nitida* Grav.). — Kg (F).

Fam. XII.: *Pselaphidae*. — Törpebogarak.

*Plectophloeus Fischeri* Aubé. — Kg (F).

*Euplectus signatus* Rchb. — Kg (F, lakásban, aug. 15, V).

*Batrisodes venustus* Rchb. — Kg (F).

*Brachygluta fossulata* Rchb. — Kg (F).

*Pselaphus Heisei* Hbst. — Kg (szénaboglya aljából, márc. 27, V).

Fam. XIII.: *Scarabaeidae*. — Lemezescsapú bogarak.

*Sisyphus Schaefferi* L. — Kg (F).

*Oniticellus fulvus* Goeze. — Kg (F), Bozsok (Végh).

*Geotrupes mutator* Marsh. — Kg (F).

*Aphodius subterraneus* L. — Kg (F).

— *haemorrhoidalis* L. — Kg (F).

— *rufipes* L. — Kg (F), Kgh (jún.—júl., K).

— *satellitius* Hbst. — Kg (F).

— *melanostictus* Schm. — Kg (F).

— *distinctus* Müll. (*inquinatus* Hbst.) ab. *nubilus* Pz. — Kg (V).

— *pubescens* Strm. — Kg (V).

— *obscurus* F. — Kg (F).

— *porcus* F. — Kg (F).

— *rufus* Moll. — Kg (F).

— *varians* Duft. — Kg (F), Cák (V).

— ab. *ambiguus* Muls. — Kg (Tálár, jún. 23, V).

— *niger* Panz. — Kg (F).

— *Sturmi* Har. — Kg (V).

— *granarius* L. — Kg (V).

*Pleurophorus caesus* Creutz. — Kg (utcán, júl. 21, V), Alsó erdő (árokavarból, aug. 2, V).

*Rhyssenus germanus* L. — Kg (F).

*Trox hispidus* Pont. — Kg (F).

— *scaber* L. — Kg (F).

*Serica brunnea* L. — Kg (F).

*Amphimallon assimilis* Hbst. — Velem (Hosszúvölgy, júl. 11, V).

— var. *Burmeisteri* Brske. — Kgh (jún.—júl., K).

*Melolontha hippocastani* F. — Kg (F).

*Anisoplia segetum* Hbst. — Kg (F).



*Hoplia philanthus* Füessly. — Kgh (jún.—júl., K).

— *hungarica* Burm. — Kg (F).

*Trichius fasciatus* L. ab. *dubius* Muls. — Kg (V).

— *sexualis* Bed. — Kgh (jún.—júl., K).

Fam. XIV.: *Hydrophilidae*. — Csiborfélék.

*Ochthebius impressus* Marsh. — Kg (V).

— *pusillus* Steph. — Svábfa lu tócsája (júl. 12, V).

*Hydraena palustris* Er. — Kg (F).

*Limnebius papposus* Muls. — Kg (V), Tachert-árok (júl. 18, V), Cák (V).

— *crinifer* Rey. — Kg (V), Talár tócsája (márc. 23, 25, V), Seybold-rét (márc. 23, V), Gubahegyi-tó (jún. 6, V).

— *nitidus* Marsh. — Alsó rétek (ápr. 29, V), Talár (márc. 23, V), Seybold-rét (jún. 29, V), Gubahegyi tócsa, (jún. 25, K), Svábfa lu (júl. 12, V).

*Spercheus emarginatus* Schall. — Gubahegyi tócsa (ápr. 2, V).

*Helophorus nubilus* F. — Kg (F, V).

— *brevitarsis* Kuw. — Kg (V).

— *brevipalpis* Bed. — Kg (V).

— — var. *montenegrinus* Kuw. — Bozsok (park-tó júl. 27, V), Velem (höforrás, V).

— *granularis* L. — Kg (V).

— *viridicollis* Steph. — Kg (rothadt gombából, okt. 10, V).

*Hydrochus elongatus* Schall. — Guba. tócsa (jún. 25, K).

— *carinatus* Germ. — Kg (F, városi téglagyár tócsája, ápr. 5, V).

— *angustatus* Germ. — Kg (F, V), Talár (márc. 23, V).

— — var. *flavipennis* Küst. — Kg (ápr. 16, V), Nemezgár (V).

*Coelostoma orbiculare* F. — Bozsok (Végh).

*Sphaeridium bipustulatum* F. — Kg (házfalon, okt. 15, V), Bozsok (Végh).

— — ab. *quadrinaculatum* Steph. — Kg (V).

— — ab. *marginatum* F. — Téglagyári tócsa (máj. 1, V).

— — var. *substriatum* Fald. — Kg (V).

*Cercyon lugubris* Ol. — Gubahegyi tócsa (jún. 25, K).

— *haemorrhoidalis* F. (*flavipes* F.). — Kg (F).

— *unipunctatus* L. — Kg (F, utcán, máj. 26, V).

— *quisquilius* L. — Özkút (aug. 7, V), Kg (tehéntrágyában, (V).

— *granarius* Er. — Óház-nyereg (okt. 17, V).

*Cryptopleurum minutum* F. (*atomarium* Ol.) — Kg (F, máj. 1, V), Alsó erdő (mohából, okt. 10, V).

*Hydrobius fuscipes* L. — Kg (F, nádas tócsa, márc. 23, V), Velem höforrás, márc. 25, V), Bozsok (Végh).

*Anacaena limbata* F. — Kg (márc. 23, V), Alsó rétek (febr. 12, ápr. 29, V), Tőzegmohás láp (ápr. 16, V), Talár (márc. 25, V), Velem (*Caltha*-n, márc. 25, V).

— — ab. *ochracea* Steph. — Kg (V).

*Laccobius bipunctatus* F. — Talár (márc. 25, V), Seybold-rét (V).

— *alutaceus* Thoms. — Kg (V), Forrás a Borhakút fölött (V).



- Philydrus fuscipennis* Thoms. — Kg (V).  
 — *quadripunctatus* Hbst. — Kg (F).  
 — *bicolor* F. — Kg (V).  
 — *testaceus* F. — Kg (F, V), Városi téglagyár tócsája (ápr. 6, V),  
 Nemezgýárnál (ápr. 8), Gubahegyi tócsa (ápr. 2, V).  
 — *minutus* F. — Kg (ápr. 16, V).  
*Cymbiodita marginella* F. — Gubahegyi tócsa (jún. 25, K).  
*Chaetarthria seminulum* Hbst. — Óház-nyereg (okt. 17, V).  
*Hydrophilus aterrimus* Eschz. — Kg (F).

Fam. XV.: *Byturidae*. — Málnabogarak.

- Byturus tomentosus* F. — Kgh (jún.—júl., K).

Fam. XVI.: *Ostomidae*. — Koronghátú bogarak.

- Nemosoma elongatum* L. — Kg (F).  
*Tenebroides mauritanicus* L. — Kg (F), Kgh (jún.—júl., K).  
*Zimium grossum* L. — Kg (F).

Fam. XVII.: *Nitidulidae*. — Fénybogarak.

- Cateretes pedicularius* L. — Gubahegy (júl. 26, V).  
*Brachypterolus pulicarius* L. — Gubahegy (júl. 26, V).  
*Meligethes aeneus* F. ab. *coeruleus* Marsh. — Kg (máj. 1, V).  
 — — ab. *australis* Küst. — Alsó rétek (máj. 12, V).  
 — *viridescens* F. — Kg (júl. 4; *Funkia*-n, V).  
 — *obscurus* Er. — Kg (júl. 4).  
 — *bidentatus* Bris. — Kg (máj. 1, V, júl. H).  
*Nitidula carnaria* Schall. — Kg (F).  
*Omosita discoidea* F. — Kg (F).  
*Epuraea guttata* Ol. (*10-guttata* F.). — Kőszeg (F).  
*Ipidia quadrimaculata* Quens. (*4-notata* F.). — Kg (F).  
*Amphotis marginata* F. — Kg (F), Kgh (jún.—júl., K).  
*Cychramus luteus* F. ab. *fungicola* Heer. — Özkút (szept. 10, V).  
*Thalycra fervida* Ol. — Kg (F).  
*Librodor quadriguttatus* F. — Kg (F).  
 — *hortensis* Fourcr. (*4-punctatus* Ol.) — Kg (F).



## Adatok Kőszeg és vidéke bogárfaunájának ismeretéhez.

CSIKI  
ERNŐ

(Folytatás.)

### Fam. XVIII. *Rhizophagidae*.

*Rhizophagus picipes* Ol. (*politus* Hellw.). — Kg. (F), Kgh. (júl. K).  
— *bipustulatus* F. — Kg. (F).

### Fam. XIX.: *Cucujidae*. — Kéregbogarak.

*Monotoma conicicollis* Guér. — Kg. (F).  
— *angusticollis* Gyll. — Alsó erdő (hangyabolyból, nov. 15, V).  
— *picipes* Hbst. — Kg. (nyárfáról; aug. 28, V).  
*Oryzaephilus surinamensis* L. — Kg. (rizsből, jan. 3, szept. 9, V).  
*Laemophloeus alternans* Er. — Kg. (márc. 5—8, nevelve, Gammel).

### Fam. XX.: *Cryptophagidae*.

*Cryptophagus scanicus* L. — Kg. (V).  
— *Thomsoni* Reitt. — Kg. (Városházi fáspercében rostálva, okt. 1, V).  
— *saginitus* Strm. — Kg. (F; fáspercében rostálva, okt. 1, V).  
— *subfumatus* Kr. — Óház (szept. 10, V).  
— *scutellatus* Newm. — Kg. (fáspercében rostálva, okt. 1, V).  
— *distinguendus* Strm. — Ugyanonnan.  
*Antherophagus nigricornis* F. — Irott kö (szept. 3, V).  
*Atomaria munda* Er. — Kg. (fáspercében rostálva, okt. 1, V).  
— *analisis* Er. — Alsó rétek (szept. 29, V).  
— *linearis* Steph. — Kg. (V).  
*Ephistemus globulus* Payk. — Kg. (fáspercében rostálva, okt. 1, V).  
Alsó rétek (szept. 29, V).

### Fam. XXI.: *Erotylidae*. — Bunkócsápú bogarak.

*Triplax lepida* Fald. — Kgh. (jún.—júl. K).

### Fam. XXII.: *Phalacridae*.

*Phalacrus substriatus* Gyll. — Gubahegy (júl. 26, V), Szabóhegy (jún. 21, V), Bozsok (park, júl. 27, V).  
*Olibrus aeneus* F. — Seybold-kőbánya (szept. 16, V).  
— *millefolii* Payk. — Óház (szept. 10, V), Pogány-völgy (szept. 17, V), Gubahegy (aug. 6, V).  
— *pygmaeus* Strm. — Özkút (aug. 7, V).  
— *bicolor* F. — Malomároknál (jún. 25, V).  
— *affinis* Strm. — Kgh. (jún.—júl., K).  
*Stilbus atomarius* L. — Kg. (aug. 14, V), Alsó rétek (ápr. 29, V), Cák (máj. 7, V).  
— *oblongus* Er. — Kg. (többfelé, ápr.—szept. V).  
— *testaceus* Panz. — Felső rétek (aug. 19, V).



Fam. XXIII.: *Lathridiidae*.

- Lathridius nodifer* Westw. — Kg. (okt. 25, V).  
*Enicmus minutus* L. — Kg. (lakásban, márc. 13, V; és többfelé, jún.—nov. V, K).  
*Corticaria umbilicata* Beck. — Tőzegmohás láp (aug. 19, V), Mexikói erdőszél (okt. 13, V).  
 — *serrata* Payk. — Kőszeg (V).  
*Corticarina gibbosa* Hbst. — Kg. (többfelé, ápr.—szept., V).  
*Melanophthalma transversalis* Gyll. — Kg. (ápr. 27, máj. 1, V).  
 — *distinguenda* Com. — Kg. (Múzeum, aug. 27, V).

Fam. XXIV.: *Cisidae*. — Fagombabogarak.

- Cis Jacquemarti* Mell. — Kg. (F).  
 — *setiger* Mell. — Óház (szept. 10, V), Óház-nyereg (okt. 17, V), Kg. (bedeguár-ból, márc. 26, V).  
 — *hispidus* Payk. — Kg. (V).  
 — *bidentatus* Ol. — Kg. (F).  
*Rhopalodontus fronticornis* Pz. — Kg. (F).  
 — *perforatus* Gyll. — Kg. (F, V).

Fam. XXV.: *Endomychidae*. — Gombalakóbogarak.

- Lycoperdina bovistae* F. — Kg. (coll. Csiki).  
 — *succincta* L. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).

Fam. XXVI.: *Coccinellidae*. — Katicabogarak.

- Subcoccinella 24-punctata* L. ab. *limbata* Moll. — Seybold-kőbánya (szept. 16, V), Alsó rétek (szept. 24, V), Téglagyár (máj. 1, V).  
 — — ab. *Festae* Beffa. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — — ab. *25-punctata* Rossi. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V).  
*Cynegetis impunctata* L. ab. *palustris* Redt. — Kg. (jún. 19, aug. 5, V).  
*Scymnus punctillum* Wse. — Kg. (fűzről, júl. 27, V), Nádas-tócsa (szept. 18, V).  
 — *rufipes* F. — Kőszegi hegység (jún.—júl. K).  
 — *quadrimaculatus* Hbst. — Kg. (ápr. 9, V).  
*Hyperaspis campestris* Eschz. — Kg. (F).  
*Adonia variegata* Goeze ab. *obversepunctata* Schrnk. — Gubahegy (aug. 7, V).  
*Adalia decempunctata* L. — Kőszeg (V), Bencés-kert (júl. 19, V).  
 — — ab. *decempustulata* L. — Kg. (almafáról, ápr. 17, V).  
 — — ab. *quadripunctata* L. — Kg. (máj. V), Kgh. (jún.—júl., K).  
 — — ab. *bimaculata* Pont. — Kg. (ápr. 17, 29, V).  
 — — ab. *guttatopunctata* L. — Kg. (szept. 14, V), Tőzegmohás láp (aug. 19, V).  
 — — ab. *innotata* Haw. (*pellucida* Wse). — Kg. (H).  
*Coccinella hieroglyphica* L. ab. *flexuosa* F. — Kg. (szept. 14, V).  
*Synharmonia conglobata* L. ab. *Illigeri* Lem. — Kg. (almafán, ápr. 17, V).  
*Harmonia quadripunctata* Pont. — Kg. (F).  
 — — ab. *rustica* Wse. — Özkút (júl. 1, V).



- Vibidia 12-guttata* Poda. — Kg. (V), Kgh. (jún.—júl. K).  
*Propylaea 14-punctata* L. ab. *Weisei* Mad. — Királyvölgy (szept. 2, V), Bozsöki-völgy (szept. 28, V), Kgh. (jún.—júl. K).  
 — ab. *agglutinata* Mad. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — ab. *pannonica* Sajó. — Ugyanonnán.  
 — ab. *12-pustulata* Pont. — Alsó rétek (szept. 24, V), Kgh. (jún.—júl. K; júl. 20—30, Székessy).

Fam. XXVII.: *Dermestidae*. — Szalonnabogarak.

- Dermestes lanarius* Ill. — Kg. (F).  
 — *undulatus* Brhm. — Kg. (F).  
 — *ater* Ol. — Kg. (F).  
*Megatoma undata* L. — Kg. (F).  
*Anthrenus verbasci* L. ab. *nebulosus* Reitt. — Kg. (júl., H; jún. 13, V).  
 — *museorum* L. — Kg. (F).

Fam. XXVIII.: *Byrrhidae*. — Labdacsbogarak.

- Pelochares versicolor* Walzl. — Felső rétek (ártér, júl. 7, V), Kgh. (jún.—júl. K).  
*Simplocaria semistriata* F. — Kg. (házfalon, szept. 21, okt. 2, 7, V), Kgh. (jún.—júl. K).  
*Lamprobyrrhulus nitidus* Schall. — Felső rétek (homokbánya, júl. 17, V).  
*Syncalypta setigera* Ill. — Alsó erdő (szept. 27, V).  
 — *spinosa* Rossi. — Alsó erdő (mohából, okt. 10, V), Kgh. (júl. K).

Fam. XXIX.: *Heteroceridae*.

- Heterocerus fenestratus* Thbg. — Kg. (F).  
 — *fuscus* Ksw. — Kg. (F).

Fam. XXX.: *Buprestidae*. — Díszbogarak.

- Dicerca berolinensis* Hbst. ab. *obscura* Schlsk. — Kg. (Coll. Kanabé, ex Kaszab [5]).  
*Buprestis octoguttata* L. — Kg. (F).  
*Eurythyrea austriaca* L. — Kg. (Kaszab [5]).  
*Anthaxia cichorii* Ol. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *millefolii* F. — Kg. (F).  
 — *Croesus* Vill. (*salicis* auct.) ab. *speciosa* Csiki. — Kg. (Pável J.).  
 — *helvetica* Strl. — Kg. (Kaszab [5]).  
*Agrilus ater* L. (6-guttatus Hbst.). — Kg. (F).  
 — *subauratus* Gebl. — Kg. (F).  
 — *auricollis* Ksw. — Kg. (F).  
 — *Roberti* Chevr. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *betuleti* Ratz. — Kg. (Kaszab [5]).  
 — *calcicola* Obg. (*ater* auct.) — Kg. (Kaszab [5]).  
 — *rubicola* Ab. (*obtus* Ab.). — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — var. *epistomal* Ab. (*communis* Obg.). — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *coeruleus* Rossi. — Kg. (F).  
 — *cyaneus* Rossi ab. *pragensis* Obg. — Kg. (Kaszab [5]).



- *asperimus* Marsh. — Kg. (júl. H; száraz galyakból nevelve: ápr. 16, 20, Gammel), Kgh. (jún.—júl., K).
- *angustulus* Ill. — Kg. (F; száraz galyakból nevelve: ápr. 10—16, Gammel). Kgh. (jún.—júl. K).
- — *ab. hungaricus* Obg. — Kg. (Kaszab [5]).
- *obscuricollis* Ksw. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *scaberrimus* Ratz. — Kg. (Kaszab [5]).
- *litura* Ksw. — Kg. (Kaszab [5]).
- *olivicolor* Ksw. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *roscidus* Ksw. — Kg. (száraz galyakból nevelve: Gammel).
- *cinctus* Ol. — Kg. (Kaszab [5]).
- Trachys pumila* Ill. — Kg. (F).

Fam. XXXI.: *Throscidae*.

- Throscus brevicollis* Bonv. — Kgh. (áfonyán, jún. 19, V).
- *elateroides* Heer. — Kgh. (*Pteris*-ről, szept. 3, V).
- *obtus* Curt. — Kgh. (jún.—júl. K).

Fam. XXXII.: *Elateridae*. — Pattanóbogarak.

- Drasterius bimaculatus* Rossi. — Kg. (F).
- Elater cinnabarinus* Eschz. *ab. atropilosus* Rye. — Bozsok (Végh).
- *sinuatus* Germ. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).
- Hypnoidus pulchellus* L. — Kg. (F).
- Athous mutilatus* Rosh. — Kg. (utcán, jún. 30, V).
- *austriacus* Desbr. — Alsó erdő (jún. 9 V).
- Corymbites nigricornis* Pz. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *bipustulatus* L. — Kg. (F; mohából, febr. 9, V).
- Agriotes ustulatus* Schall. *ab. flavicornis* Pz. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Adrastus pallens* F. — Kg. (V).
- *rachifer* Fourcr. — Kg. (V).
- *montanus* Scop. — Kőszeg (jún. 21; *Acer*-ről, aug. 2, V), Özkút (ápr. 1, V), Szalónak (aug. 9, V).

Fam. XXXIII. *Helodidae*.

- Helodes minuta* L. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Cyphon variabilis* Thbg. — Tőzegmohás láp (jún. 11, júl. 29. aug. 19, V).
- *padi* L. *ab. discolor* Pz. — Alsó erdő (szept. 22, V), Tőzegmohás láp (aug. 19, V).
- Eucinetus haemorrhous* Duft. — Bozsok (park, júl. 27, V).

Fam. XXIV.: *Cantharidae*. — Puhatestű bogarak.

- Homaligus Fontisbellaquei* Fourcr. — Kg. (F).
- Dictyopterus rubens* Gyll. — Kg. (F).
- *affinis* Payk. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).
- Cantharis livida* L. *ab. rufipes* Hbst. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Malthinus flaveolus* Payk. *ab. immunis* Marsh. — Özkút (júl. 1, V), Óház (jún. 19, V).



- *facialis* Thoms. — Kg. (júl. 3, V).  
*Malthodes marginatus* Latr. — Tőzegmohás láp (máj. 17, V).  
 — *guttifer* Ksw. — Bozsok (máj. 25, V).  
*Drilus concolor* Ahr. — Kg. (jún. 21, V).  
*Charopus flavipes* Payk. — Kg. (júl. H).  
*Ebaeus appendiculatus* Er. — Alreál (jún. 27, V).  
*Axinotarsus ruficollis* Ol. — Kg. (F), Szabóhegy (jún. 21, V), Reál-park (júl. 13, V).  
 — *pulicarius* F. — Kőszeg (F).  
*Malachius marginellus* Ol. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *bipustulatus* L. ab. *immaculatus* Rey. — Ugyanonnan.  
*Anthocomus bipunctatus* Harr. — Kőszeg (ablakon, jún. 22, V).  
 — *fasciatus* L. — Kg. (máj. 2, V).  
*Haplocnemus nigricornis* F. — Kg. (Városházi fászincében rostálva, okt. 1, V).  
*Dasytes subaeneus* Schönh. — Kg. (F).

Fam. XXXV.: *Cleridae*. — Tarkabogarak.

- Tillus unifasciatus* F. — Kgh. (jún.—júl. K).  
*Necrobia violacea* L. — Kg. (F).  
 — *rufipes* Deg. — Kg. (fügéből, dec. 17, Tóth Sándorné).

Fam. XXXVI.: *Bostrychidae*. — Csuklyás szuvak.

- Psoa viennensis* Hbst. — Kg. (máj. 17, V).

Fam. XXXVII.: *Anobiidae*. — Kopogóbogarak.

- Hedobia regalis* Duft. — Kgh. (jún.—júl. K).  
*Xestobium rufovillosum* Deg. — Kőszeg (F), Bozsok (Végh).  
*Ernobius nigrinus* Strm. — Kg. (F), Alsó erdő (fenyőtobozból, dec. 21, V).  
*Stegobium paniceum* L. — Kg. (jún. 21, júl. 22, V), Talár (júl. 2, V).  
*Anobium rufipes* F. — Kg. (V), Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *costatum* Arrag. (fagi Muls.). — Kgh. (jún.—júl. K).

Fam. XXXVIII.: *Ptinidae*. — Tolvajbogarak.

- Ptinus Edmundi* Ab. — Alsó erdő (nov. 15, V).

Fam. XXXIX.: *Tenebrionidae*. — Gyászbogarak.

- Hoplocephala haemorrhoidalis* F. — Kg. (F).  
*Platydemus Dejeani* Cast. — Kg. (F).  
*Hypophloeus pini* Pz. — Kőszeg (F).  
 — *bicolor* Ol. — Óház-nyereg (gomba, okt. 17, V).  
*Cylindronotus convexus* Küst. — Kg. (F).

Fam. XL.: *Alleculidae*.

- Allecula aterrima* Rosh. — Kg. (F).  
*Mycetochara linearis* L. — Kg. (F).



Fam. XLI.: *Serropalpidae*.

*Tetratoma fungorum* F. — Kg. (coll. Csiki).

*Eustrophus dermestoides* F. — Kg. (F).

*Orchesia micans* Panz. — Kg. (F).

Fam. XLII.: *Mordellidae*.

*Mordella perlata* Sulz. ab. *sempunctata* Hbst. — Kgh. (jún.—júl. K).

— *fasciata* F. ab. *interrupta* Costa. — Ugyanonnán.

*Mordellistena variegata* F. — Kg. (júl., H).

*Anaspis brunnipes* Muls. — Kg. (júl., H), Velem (júl. 4, V).

Fam. XLIII.: *Meloidae*. Hólyaghúzó bogarak.

*Meloë autumnalis* OL. — Kgh. (szept. 24—28. Állatr. Int.), Kg. (F).

— *rugosus* Marsh. — Kőszeg (F).

*Zonitis bifasciatus* Schwartz. — Kg. (F).

*Hapalus (Sitaris) muralis* Forst. — Kg. (F; házfalon, aug. 19 és 20, V; coll. Csiki), Léka (házfalon, aug. 3, V).

Fam. XLIV.: *Aderidae*.

*Aderus pygmaeus* Deg. — Kg. (Várkert, V).

Fam. XLV.: *Anthicidae*. — Hangyautánzó bogarak.

*Anthicus floralis* Mrsh. — Kg. (F).

— *hispidus* Rossi. — Alsó erdő (fenyőtobozból, dec. 21, V).

— *antherinus* L. — Kg. (F; júl. 3, V), Felső rétek (aug. 12, V), Kgh. (jún.—júl. K.)

— *bifasciatus* Rossi. — Kg. (V).

Fam. XLVI.: *Pythidae*.

*Lissodema quadripustulatum* Mrsh. — Kg. (júl. V).

*Rhinosimus (Vincenzellus) viridipennis* Latr. — Kgh. (jún.—júl. K).

*Mycteris curculionoides* F. — Kg. (F).

Fam. XLVII.: *Oedemeridae*. — Dagadtlábú bogarak.

*Xanthochroa carniolica* Gistl. — Kg. (utcán, jún. 22, V), Kgh. (jún.—júl. K).

*Nacerdes ustulata* F. — Kg. (F).

— *fulvicollis* Scop. — Kg. (F).

— *adusta* Pz. — Kg. (F), Bozsok (Végh).

*Chrysanthia viridis* Schm. ab. *geniculata* Heyd. — Tőzegmohás láp (júl. 9, V), Kgh. (jún.—júl. K).

*Oedemera flavipes* F. — Kg. (F, V).



## Adatok Kőszeg és vidéke bogárfaunájának ismeretéhez.

CSIKI  
ERNO

(Befejezés.)

### Fam. XLVIII. *Cerambycidae*. — Cincérek.

*Tetropium castaneum* L. ab. *fulcratum* F. — Velem (Larix-ból nevelve: márc. 3, Gammel).

*Criocephalus fesus* Muls. — Kg. (Pável), a magyar faunára új.

*Grammoptera ustulata* Schall. — Kg. (F), Talár (máj. 14, V).

*Leptura livida* F. — Kgh. (jún.—júl. K), Bozsok (coll. Végh).

— *maculicornis* Deg. — Kg. (F).

— *dubia* Scop. ab. *chamomillae* F. — Kgh. (jún.—júl. K).

*Judolia erratica* Schönh. ab. *septemsignata* Küst. — Ugyanonnan.

— — ab. *erythrura* Küst. — Ugyanonnan.

*Strangalia aurulenta* F. ab. *lugdunensis* Pic. — Ugyanonnan.

*Molorchus minor* L. — Kg. (F).

*Dilus fugax* Ol. — Kg. (F).

*Phymatodes linearis* Hmpe. — Kg. (júl., H).

— *testaceus* L. ab. *fennicus* F. — Kgh. (jún.—júl. K).

— — var. *melanocephalus* Pza. — Kg. (V).

*Callidium aeneum* Deg. — Kg. (Szovják dr.).

*Hylotrupes bajulus* L. ab. *scutifer* Voet (*lividus* Muls.). — Kgh. (jún.—júl., K).

*Exocentrus punctipennis* Muls. — Kgh. (jún.—júl. K).

*Saperda punctata* L. — Kg. (F).

*Oberea erythrocephala* Schrnk. — Kg. (F).

*Phytoecia nigricornis* F. — Kisharang-dűlő (jún. 19, V).

— *cylindrica* L. — Kg. (F).

— *icterica* Schall. — Alsó rét (júl. 9, V), Bozsok (Végh).

### Fam. XLIX.: *Chrysomelidae*. — Levélbogarak.

*Donacia simplex* F. — Kg. (F), Bozsok (Végh).

*Plateumaris braccata* Scop. — Kg. (máj. Szilády; V).

*Zeugophora flavicollis* Marsh. — Kg. (F).

*Lema Erichsoni* Suffr. — Tőzegmohás lápnál (júl. 25, V).

— *lichenis* Voet. — Kgh. (jún.—júl. K).

*Crioceris asparagi* L. ab. *cruciata* Schust. — Kg. (V).

— — ab. *anticeconjuncta* Pic. — Kgh. (jún.—júl. K).

*Labidostomis cyanicornis* Germ. — Ugyanott.

*Coptocephala unifasciata* Scop. ab. *quadrimaculata* Lac. — Kg. (F).

— *rubicunda* Laich. — Rőti-völgy (aug. 12, V).

*Pachybrachys hieroglyphicus* Laich. — Kg. (F).

*Cryptocephalus aureolus* Suffr. ab. *subcoeruleicolor* Pic. — Kgh. (jún.—júl. K).

— *sericeus* L. ab. *pratensis* Suffr. — Ugyanonnan.

— *hypochoeridis* L. — Kg. (júl., H), Kgh. (jún.—júl. K).

— — ab. *frigidus* Jakobs. — Kg. (júl., H).



- *janthinus* Germ. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *frenatus* Laich. — Kg. (F).
- *Moraei* L. ab. *vittiger* Mars. — Özkút (júl. 1, V).
- — ab. *arquatus* Wse. — Özkút (júl. 1, V), Kgh. (jún.—júl. K).
- *strigosus* Germ. — Kg. (aug. 14, V), Gubahegy (aug. 6, V).
- *pusillus* F. — Kgh. (jún.—júl. K).
- — ab. *Marshami* Wse. — Ugyanonnán.
- Lamprosoma Kolbei* Scholz (*concolor* auct. non Strm.) — Kg. (F).
- Pachnephorus tessellatus* Duft. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V).
- *villosus* Duft. — Ugyanonnán.
- Chrysolina fimbrialis* Küst. — Kg. (F).
- *purpurascens* Germ. — Kg. (F).
- *oricalcia* Müll. — Kg. (júl., H).
- — ab. *laevicollis* Ol. — Seybold-rét (márc. 23, V).
- *fastuosa* Scop. ab. *speciosa* L. — Kgh. (júl. 20—30, Székessy).
- *polita* L. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K), Bozsok (Végh).
- Phaedon armoraciae* L. — Kg. (F).
- Prasocuris junci* Brhm. — Kg. (F).
- Phytodecta Linneana* Schrnk. ab. *decastigma* Duft. — Kg. (júl., H).
- Galerucella pusilla* Duft. — Kg. (H), Tőzegmohás láp (júl. 25, V).
- Galeruca laticollis* Sahlbg. — Kg. (F). Ha ez a bogár tényleg Kőszegről való, akkor ez lenne első ismert magyarországi termőhelye.
- Lochmaea crataegi* Forst. — Kg. (F).
- Luperus circumfusus* Marsh. — Kg. (F; júl., H), Kgh. (jún.—júl. K).
- *pinicola* Duft. — Felső erdő (júl. 13, V).
- Phyllotreta nemorum* L. — Kg. (F), Alsó erdő (avarból rostálva, febr. 14, szept. 22, nov. 20, V).
- *nigripes* F. — Kg. (többfelé rostálva, jún.—nov. V).
- Aphthona abdominalis* Duft. — Kg. (*Calluna*-ról, jún. 11, V).
- *pygmaea* Kutsch. — Reál-park (aug. 19, V), Kőrös-forrás (aug. 31, V).
- Longitarsus nigrofasciatus* Goeze. — Kg. (házfalon, okt. 17, V).
- *lycopi* Foudr. — Kg. (V), Róti-völgy (aug. 12, V).
- *substriatus* Kutsch. — Kg. (házfalon, okt. 17, V), Alsó erdő (az ólmodi út mellett, szept. 21, V).
- *pratensis* Panz. — Kg. (V), Alsó rétek (szept. 24, V), Mexikói erdőszél (okt. 13, V).
- *niger* Koch. — Kg. (aug. 19, V), Bozsoki-völgy (szept. 25, V).
- *anchusae* Payk. — Kg. (V).
- Ochrosis ventralis* Ill. — Kg. (Chernel-kert, júl. 30 és a tőzegmohás lápnál, júl. 25, V).
- Crepidodera transversa* Marsh. — Kg. (F), Léka (Pálkút, aug. 5, V).
- Hippuriphila Modeeri* L. — Felső rétek (szept. 12, V), Gubahegy (júl. 26, V).
- Chalcoides Plutus* Latr. — Kg. (aug. 19, V).
- Podagrica fuscicornis* F. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Pilemostoma fastuosa* Schall. — Kg. (F).
- Hypocassida subferruginea* Schrnk. — Kg. (júl., H).
- Cassida canaliculata* Laich. — Kg. (F).
- *flaveola* Thbg. — Cák (V).



- *ferruginea* Goeze. — Kg. (F). Siófok-ról is ismerem ezt a Magyarországi faunájára új fajt.
- *stigmatica* Suffr. — Kgh. (jún.—júl. K).

Fam. L.: *Bruchidae*. — Zsizsikfélék.

- Bruchidius pusillus* Germ. — Pogányvölgy (szept. 17, V).
- — *ab. picipes* Germ. — Királyvölgy (szept. 2, V), Puckel-gesztenyés (szept. 3, V), Óház (szept. 10, V).

Fam. LI.: *Anthribidae*. — Laposorrú ormányosok.

- Rhaphitropis marchicus* Hbst. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Dissoleucas niveirostris* F. — Kg. (F).
- Brachytarsus (Anthribus) fasciatus* Först. — Alsó rétek (ápr. 29, V).

Fam. LII.: *Curculionidae*. — Ormányosok.

- Otiorrhynchus armadillo* Rossi. — Kg. (1900. jún., M. N. Múzeum).
- *hungaricus* Germ. — Kg. (F).
- *niger* F. — Kg. (F).
- *foraminosus* Boh. — Kg. (F). Ez az eddig Svájc-ból, Tirolból és Krajná-ból ismeretes faj faunánkra új lenne, ha tényleg Kőszegről való.
- *sulcatus* F. — Kg. (F).
- *chrysocomus* Germ. — Kg. (F).
- *conspersus* Germ. — Kg. (F).
- Phyllobius pictus* Stev. — Kgh. (jún.—júl., K).
- *betulae* F. — Kg. (máj. V).
- — *ab. aurifer* Boh. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Polydrosus confluens* Steph. — Ugyanonnan.
- *amoenus* Germ. — Ugyanonnan.
- Liophloeus tessulatus* Müll. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K), Bozsok (Végh).
- *lentus* Boh. — Kg. (F).
- Brachysomus styriacus* Form. — Kg. (Alsó erdő, avarból, febr. 14 V).  
Magyarországi faunájára új. Ismerem még a Mecsek-hegységből (Melegmány, jún. 3, Csiki), Gyenesdiásról és Zircről.
- Barynotus obscurus* F. — Kg. (F).
- Sitona suturalis* Steph. — Kg. (máj. V), Bozsoki-völgy (szept. 25, V).
- *puncticollis* Steph. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *humeralis* Steph. — Kg. (házfalon, szept. 21, okt. 7, V), Kgh. (jún.—júl. K).
- Trachyploeus laticollis* Boh. — Kg. (F).
- *aristatus* Gyll. — Bozsok (szept. 25, V), Kg. (Felső rétek, okt. 19, V; szénaboglya-aljából, márc. 27, V).
- Cleonus tigrinus* Pz. — Kg. (F), Ólmodi út (júl. 25, V), Gubahegy (aug. 18, V), Kgh. (jún.—júl. K), Bozsok (Végh).
- Lixus iridis* Ol. — Kg. (F).
- Hypera viennensis* Hbst. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Phytonomus rumicis* L. — Felső rétek (homokbánya, júl. 7, V), Kgh. (jún.—júl. K).
- *pedestris* Payk. — Kg. (V).



- Hylobius transversovittatus* Goeze (*fatuus* Rossi). — Kgh. (júl., K).  
*Plinthus Parreysi* Boh. — Ugyanonnan.  
 — *Megerlei* Pz. — Kg. (F).  
*Pissodes piceae* Ill. — Irott kö (aug. 14, Fábán).  
 — ab. *ferrugineus* Rey. — Velem (erdei fenyőből nevelve: ápr. 15, Gammel). Ha egyáltalában külön nevet érdemel, akkor ez az első adat magyarországi előfordulására.  
 — *scabricollis* Mill. — Kgh. (jún.—júl. K).  
*Magdalis flavicornis* Gyll. — Kg. (száraz galyakból nevelve: ápr. 15, Gammel).  
 — *armigera* Fourcr. — Kg. (F).  
 — *carbonaria* L. — Kg. (F).  
*Curculio venosus* Grav. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).  
*Balanobius crux* F. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *pyrrhoceras* Marsh. — Kg. (F; máj. 12, Szelényi).  
*Elleschus scanicus* Payk. — Kg. (F).  
*Tychius meliloti* Steph. — Kg. (júl., H).  
*Miccotrogus picirostris* F. — Kg. (júl., H; Sintérrét, júl. 6, V), Kgh. (jún.—júl. K).  
*Bagous cylindrus* Payk. — Kg. (V).  
*Dorytomus taeniatus* F. — Kg. (F).  
 — *affinis* Payk. — Kg. (F).  
 — *validirostris* Gyll. — Kg. (V).  
 — *tremulae* Payk. — Kg. (F).  
 — *tortrix* L. — Kg. (F).  
*Notaris acridulus* L. — Kg. (V).  
*Nanophyes nitidulus* Gyll. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *marmoratus* Gze. ab. *ruficollis* Rey. — Felső rétek (ártér, júl. 7, V), Alsórétek (nádas tócsa, szept. 18, V).  
*Mecinus pyraister* Hbst. — Kg. (F).  
*Gymnetron veronicae* Germ. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *bipustulatum* Rossi. — Kg. (F).  
*Cionus Olivieri* Rossch. — Kg. (F).  
 — *thapsi* F. — Felső rétek (júl. 22, V), Róti-völgy (aug. 12, V).  
*Rhynchaenus quercus* L. — Kg. (F, V).  
 — *jota* F. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *sparsus* Fahrs. — Ugyanonnan.  
 — *pratensis* Germ. — Ugyanonnan.  
 — *salicis* L. — Ugyanonnan.  
 — *foliorum* Müll. — Ugyanonnan.  
*Phytobius Waltoni* Boh. — Kgh. (jún.—júl. K).  
*Rhinoncus pericarpus* L. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *gramineus* F. — Kg. (V), Nemezgyárnál (ápr. 3, V).  
 — *perpendicularis* Rch. — Kgh. (jún.—júl. K).  
*Zacladus affinis* Payk. — Kg. (F).  
*Ceuthorrhynchus terminatus* Hbst. — Kg. (házfalon, szept. 21, okt. 7, V).  
 — *crucifer* Ol. — Kg. (F).  
 — *ornatus* Gyll. — Kgh. (jún.—júl. K).  
 — *asperifoliarum* Gyll. — Kg. (F), Kgh. (jún.—júl. K).



- *pleurostigma* Marsh. — Talár (márc. 23, V).
- *erysimi* F. ab. *cyaneus* Wse. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Stenocarus fuliginosus* Marsh. — Kgh. (F).
- Limnobaris pusio* Boh. — Borsmonostor (júl. 9, H); Kőszeg (Alsó rétek, ápr. 29, V).
- *T-album* L. — Alsó rétek (ápr. 29, V).
- Acalles echinatus* Germ. — Óház-nyereg (okt. 17, V).
- Eremotes elongatus* Gyll. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *porcatus* Germ. — Kgh. (F).
- Apion brevirostre* Hbst. — Kgh. (jún.—júl., K).
- *curvirostre* Gyll. — Ugyanonnán.
- *longirostre* Ol. — Ugyanonnán.
- *Formaneki* Wagn. — Ugyanonnán.
- *corniculatum* Germ. — Ugyanonnán.
- *elongatum* Desbr. — Ugyanonnán.
- *sanguineum* Deg. — Kgh. (júl., H).
- *minimum* Hbst. — Talár (márc. 25, V).
- *dispar* Germ. — Alsó rétek (szept. 24, V).
- *Hookeri* Kby. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *ebeninum* Kby. — Kgh. (máj. 12, Szelényi).
- *pisi* F. — Reálpark (aug. 19, V), Kgh. (jún.—júl. K).
- *aestivum* Fst. — Kgh. (jún.—júl. K).
- *columbinum* Gm. — Ugyanonnán.
- *aestivum* Germ. — Alsó erdő (az olmódi út mellett, szept. 22, V), Puckel-gesztenyész (szept. 3, V), Sintérrét patakja mellett (aug. 18, V).
- *varipes* Germ. — Alsó rétek (szept. 24, V).
- *ononicola* Bach. — Kgh. (Fábián).
- Diodyrhynchus austriacus* Ol. ab. *lutescens* Schlsk. — Kgh. (máj. 12, Szelényi).
- Auletobius sanguisorbae* Schrnk (*basilaris* Gyll.). — Kgh. (júl., K).
- Coenorrhinus germanicus* Hbst. — Ugyanonnán.

Fam. LIII.: Scolytidae. — Szűbogarok.

- Scolytus Ratzeburgi* Jans. — Kgh. (F).
- *rugulosus* Ratz. — Kgh. (jún.—júl., K).
- Hylurgus ligniperda* F. — Kgh. (F).
- Hylastes opacus* Er. — Kgh. (F).
- Ernopus tiliae* Pz. — Kgh. (hársfából nevelve: ápr. 28, Gammel).
- Trypodendron domesticum* L. — Kgh. (F).
- Xyleborus eurygraphus* Ratzb. — Kgh. (F), Kgh. (jún.—júl. K).
- *monographus* F. — Ugyanonnán.
- *dryographus* Ratzb. — Ugyanonnán.
- Pityophthorus pityographus* Ratzb. — Velem (jegenyefenyőből nevelve: ápr. 15, Gammel).
- Taphrorychus villifrons* Duf. — Kgh. (jún.—júl. K).
- Pityogenes chalcographus* L. — Kgh. (V).
- *quadridens* Hart. — Kgh. (V).
- Pityokteines curvidens* Germ. — Kgh. (F).
- Orthotomicus laricis* F. — Kgh. (F).



Végül még meg akarom jegyezni, hogy a nagy futrinkák pontosabb megvizsgálása alapján meg voltak állapíthatók azoknak Kőszeg vidékén előforduló fajtái és így K a s z a b jegyzékében [4] a következő változtatások eszközlendők:

- Carabus catenulatus* auct. non Scop. helyett *C. problematicus* Hbst.  
 — *auronitens* F. helyett var. *Kraussi* Lpg.  
 — *variolosus* F. helyett var. *nodulosus* Creutz.  
 — *cancellatus* Ill. helyett var. *nigricornis* Dej.  
 — *Ulrichi* Germ. helyett var. *parvus* Géh.  
 — *arvensis* (recte: *arcensis*) Hbst. és ab. *Schrikelli* Dej. helyett var. *Austriacae* Sok.

A Cucujidák között elírás folytán közölt *Hololepta plana* L. alatt *Uleiota planata* L. értendő.

A F r e h adatai alapján felvett *Nebria picicornis* F. és *Jokischi* Strm., *Lethrus apterus* Laxm., *Melanophila acuminata* Deg. és *Menephilus cylindricus* Hbst. pedig törlendők a jegyzékből, mert F r e h leltárából kitűnt, hogy azok nem kőszegi származásúak.

Az [5]- és [6]-alatti közlemények alkalmából eszközölt felülvizsgálat alapján pedig még *Stenus carbonarius* Gyll. és *Anthaxia 4-punctata* ab. *Godeti* Lap. is törlendők a [4]-alatti jegyzékből.

\*

### E. Csiki: Beiträge zur Kenntnis der Käferfauna von Kőszeg und Umgebung.

(Auszug.) Vor vier Jahren erschien unter dem Titel „Grundlagen zur Kenntnis der Käferfauna des Kőszeger Gebirges“ eine Arbeit von Z. K a s z a b, in welcher er ein Verzeichnis jener Käfer veröffentlichte, welche aus diesem Gebiete bishin bekannt wurden.

Seither habe ich auch an der Arbeit teilgenommen, indem ich die Bestimmung der für das Museum in Kőszeg gesammelten Käfer übernahm. Das Material wurde grösstenteils von dem eifrigen Leiter des Museums, von Herrn Dr. A. V i s n y a gesammelt. Auch harzte der Bearbeitung das von weil. Dr. G. H o r v á t h, Oberdirektor des Ungarischen National-Museums i. R., noch im Jahre 1933 gesammelte Material, sowie jenes, welches von Dr. Z. K a s z a b vom 22. Juni bis 20. Juli 1937 gesammelt wurde. Letzteres Material gelangte nachher teilweise in das Ungarische National-Museum (Budapest), sowie teilweise in das Städtische Museum von Kőszeg. Vieleangaben entnahm ich auch dem 1893 abgeschlossenen Inventar des Benediktiner-Professors A. F r e h aus dem Benediktiner-Gymnasium in Kőszeg. Herr Dr. Z. K a s z a b war so freundlich dieses Inventar durchzusehen und daraus jene Arten herauszuschreiben, welche in F r e h's 1878 erschienenem Verzeichnisse noch nicht zu finden sind, also wohl aus den Sammelergebnissen späterer Jahre stammen. Unter den F r e h'schen Käfern befinden sich einige, deren Vorkommen ich bezweifeln muss, diese müssen zur Bekräftigung nochmals gesammelt werden. Diese habe ich mit betreffenden Notizen versehen. Wenige Arten wurden nach Exemplaren meiner Sammlung in die Liste aufgenommen, diese verdanke ich grösstenteils Herrn Dr. G. S z e l é n y i.

Während der Bestimmungsarbeit konnte ich viele Arten und Varietäten feststellen, welche aus dem Gebiete von Kőszeg und Umgebung noch nicht bekannt waren. Ihre Zahl ist nicht unbedeutend, ungefähr 730 Arten und Varietäten, so dass die Gesamtzahl der Arten und Varietäten des Gebietes auf 2111 steigt.



Die Namen der Sammler gebe ich abgekürzt an; so bedeutet: F = Alfons Freh, H = Dr. Géza Horváth, K = Dr. Zoltán Kaszab und V = Dr. Aladár Visnya; weniger oft vorkommende Namen von Sammlern wurden nicht gekürzt. Ebenso wurden die häufigsten Fundortsnamen abgekürzt, wie: Kg. = Köszeg, Kgh. = Köszeger-Gebirge.

Am Schlusse des Verzeichnisses werden einige Corrigenda zum Verzeichnisse Kaszab's gegeben. So müssen, nachdem die grösseren Laufkäfer eingehender untersucht wurden und deren Rassenangehörigkeit festgestellt wurde, im Verzeichnis folgende Aenderungen vorgenommen werden:

*Carabus catenulatus* auct. non Scop. = *problematicus* Hbst.

— *auronitens* F. = var. *Kraussi* Lapg.

— *variolosus* F. = var. *nodulosus* Creutz.

— *cancellatus* Ill. = var. *nigricornis* Dej.

— *Ullrichi* Germ. = var. *parvus* Géh.

— *arvensis* (recte: *arcensis*) Hbst. und ab. *Schrikelli* Dej. = var. *Austriacae* Sok.

Unter den Cucujiden ist infolge eines Verschreibens statt *Hololepta plana* L., *Uleiota planata* L. zu lesen.


Die den Angaben Freh's zufolge aufgenommenen Arten: *Nebria picicornis* F. und *N. Jokischi* Strm., *Lethrus apterus* Laxm., *Melanophila acuminata* Deg. und *Menephilus cylindricus* Hbst. sind zu streichen, nachdem es sich aus dem Freh-schen Inventar feststellen liess, dass diese nicht Köszeger Abstammung sind.

Auf Grund einer genaueren Überprüfung bei Gelegenheit der Veröffentlichungen [5] und [6] sind ausserdem noch *Stenus carbonarius* Gyll. und *Anthaxia 4-punctata* L. ab. *Godeti* Lap. aus der Liste [4] zu streichen.

Unter den im obigen Verzeichnis aufgezählten Arten, befinden sich einige, welche auch für die Fauna Ungarns neu sind, und zwar: *Demetrias atricapillus* L. ab. *erythrocephalus* Buyss., *Sericoderus Visnyae* Csiki (die lateinische Beschreibung dieser neuen Art siehe ausser der unter [3] angegebenen Literatur, auch hier auf Seite 162 des ungarischen Textes), *Criocephalus fesus* Muls. (*polonicus* Motsch.), *Cassida ferruginea* Goeze, *Brachysomus styriacus* Form., *Pissodes piceae* Ill. ab. *ferrugineus* Rey.











A II. sorozatból eddig a kö- || Ex serie IIa adhuc numeri  
vetkező számok jelentek meg: || sequentes edebantur:

1. Szalay László dr.: Adatok a Kőszegi-hegység százlábú (Chilopoda) faunájának ismertetéséhez. — L. Szalay: Beiträge zur Kenntnis der Chilopoden-Fauna des Kőszeger Gebirges. (Auszug.)
2. Győrfi János dr., Móczár László dr., Szelényi Gusztáv dr., † Ramon Anton: Újabb adatok a Kőszegi-hegység hártvásszárnyú faunájához I. — J. Győrfi, L. Móczár, G. Szelényi, † A. Ramon: Neue Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna des Kőszeger Gebirges. (Auszug.)
3. Pongrácz Sándor dr.: Adatok a Kőszegi-hegység egyenesszárnyúinak ismeretéhez. — A. Pongrácz: Beiträge zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Umgebung von Kőszeg. (Auszug.)
4. Kolosváry Gábor dr.: Újabb adatok Kőszeg vidékének kaszás-pókfaunájához. — G. Kolosváry: I dati nuovi della fauna Opilioniidea di Kőszeg. (Risultati.)
5. Szent-Ivány József dr.: Adatok a kőszegvidéki ugróvillás rovarok (Collembola) ismeretéhez. — J. Szent-Ivány: Beitrag zur Kenntnis der Collembolen-Fauna der Umgebung von Kőszeg. (Auszug.)
6. Csiki Ernő: Adatok Kőszeg és vidéke bogárfaunájának ismeretéhez. — E. Csiki: Beiträge zur Kenntnis der Käferfauna von Kőszeg und Umgebung. (Auszug.)











1973 AUG 1



